



Dexvetidine™

DIN 02483947

Injection de dexmédomidine - 0,5 mg/mL

Sédatif et analgésique pour chiens et chats

Dexvetidine est indiqué chez les chiens et les chats à titre de sédatif et d'analgésique pour faciliter les examens cliniques, les interventions cliniques, les interventions chirurgicales mineures et les interventions dentaires mineures. Dexvetidine est aussi indiqué chez les chiens et les chats comme agent pré-anesthésique avant une anesthésie générale.



Posologie et mode d'administration:

Les chats et les chiens devraient être à jeun durant les 12 heures précédant l'administration de Dexvetidine. Il est recommandé d'appliquer un lubrifiant oculaire dans les yeux afin de prévenir l'assèchement de la cornée qui pourrait se produire pendant la sédation. Après avoir reçu Dexvetidine, les animaux devraient pouvoir se reposer calmement durant 15 minutes; les effets sédatifs et analgésiques apparaissent 5 à 15 minutes après l'administration et les effets maximaux s'observent après 20 à 30 minutes.

Voir la notice pour les tableaux de doses et les informations complètes sur les effets secondaires, précautions, mises en garde et contre-indications

Entreposage: Entreposer entre 15°C et 30°C.
Protéger du gel. Jeter le contenu inutilisé 56 jours après l'ouverture du flacon.

	CDMV	VPCL	WDDC	AVP
10mL:	124389	7751020	137519	3820620

